

Blühkalender der Korbblütengewächse (Asteraceae) 1. Teil für Wildbienen in Gärten

Wildbienen benötigen ein großes Angebot an Korbblütlern in Gärten. Die Kombination verschiedener Arten und Blütezeiten sorgt für ein gutes Pollenangebot während der gesamten Lebensdauer der Wildbienen.

Die Tabelle ist nach Bedeutung geordnet: Ganz oben stehen die besonders wichtigen Wildbienenpflanzen, ganz unten stehen die Vertreter der Pflanzenfamilie, deren Bedeutung für Wildbienen in Gärten geringer oder unbekannt ist. Für ein gutes Pollenangebot sollten die obersten 3 Pflanzen mit unterschiedlichen Blütezeiten aus dem mittleren Tabellenbereich kombiniert werden. Je höher die Anzahl der gepflanzten Exemplare, desto besser für den Wildbienen-Nachwuchs. Die untersten 9 Tabellenplätze locken möglicherweise weniger Wildbienen an.

Artnamen/Blühmonat u. Farbe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wiesenflockenblume (<i>Centaurea jacea</i>)					x	x	x	x				
Rainfarn (<i>Tanacetum vulgare</i>)							x	x	x			
Gew. Kratzdistel <i>Cirsium vulgare</i> (oder andere Disteln)					x	x	x	x				
Färberkamille (<i>Anthemis tinctoria</i>)					x	x	x	x	x	x	x	
Schwarze Flockenbl. (<i>Centaurea nigra</i>)						x	x	x	x			
Skabiosenflockenbl. (<i>Centaurea scabiosa</i>)						x	x	x	x			
Rispenflockenbl. (<i>Centaurea stoebe</i>)							x	x	x			
Wiesenschafgarbe (<i>Achillea millefolium</i>)						x	x	x	x	x	x	
Wegdistel (<i>Carduus acanthoides</i>)						x	x	x	x	x		
Krause Distel (<i>Carduus crispus</i>)						x	x	x	x			
Wollköpfige Distel (<i>Cirsium eriophorum</i>)						x	x	x				
Knollenkratzdistel (<i>Cirsium tuberosum</i>)						x	x	x				
Straußblütige Margerite (<i>Tanacetum corymbosum</i>)						x	x					
Margerite (<i>Leucanthemum vulgare</i>)				x	x							
Flohkraut (<i>Pulicaria dysenterica</i>)								x	x	x		
Goldgarbe (<i>Achillea filipendulina</i>)					x	x	x					
Echter Alant (<i>Inula helenium</i>)							x	x	x			
Telekie (<i>Telekia speciosa</i>)							x	x				
Ochsenauge (<i>Buphthalmum salicifolium</i>)					x	x	x					
Kornblume (<i>Centaurea cyanus</i>)					x	x	x	x	x	x		
Ackerhundskamille (<i>Anthemis arvensis</i>)					x	x	x	x	x	x		
Geruchlose Kamille (<i>Tripleurospermum inodorum</i>)					x	x	x	x	x	x	x	x
Schwertblättr. Alant (<i>Inula ensifolia</i>)						x	x					
Deutscher Alant (<i>Inula germanica</i>)						x	x					
Weidenbl. Alant (<i>Inula salicina</i>)							x	x				
Eselsdistel (<i>Onopordum acanthium</i>)						x	x	x				
Mutterkraut (<i>Tanacetum parthenium</i>)					x	x	x	x				
Bergflockenblume (<i>Centaurea montana</i>)					x	x						
Huflattich (<i>Tussilago farfara</i> (wuchert))		x	x									
Kamille (<i>Chamaemelum nobile</i>)						x	x	x				
Sandstrohblume (<i>Helichrysum arenaria</i>)							x	x				
Kalkaster und Sorten (<i>Aster amellus</i>)								x	x	x		
Goldhaaraster (<i>Aster linosyris</i>)								x	x			
Alpenaster (<i>Aster alpinus</i>)								x	x			
Echte Goldrute (<i>Solidago virgaurea</i>)							x	x	x			

Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ital. Strohblume (<i>Helichrysum italicum</i>)						x	x	x				
Heiligenkraut (<i>Santolina</i> (alle))					x	x						
Saat-Wucherblume (<i>Chrysanthemum segetum</i>)							x	x	x			
Greiskraut (<i>Senecio</i> , alle (für Pferde giftig))						x	x	x	x	x		
Nickende Distel (<i>Carduus nutans</i>)						x	x	x	x			
Sumpfkatzdistel (<i>Cirsium palustre</i>)					x	x						
Mariendistel (<i>Silybum marianum</i>)						x	x	x				
Deutscher Alant (<i>Inula germanica</i>)							x					
Färberscharte (<i>Serratula tinctoria</i>)								x	x			
Edelgarbe (<i>Achillea nobilis</i>)					x	x						
Sumpfgarbe (<i>Achillea ptarmica</i>)					x	x	x	x				
Graue Kratzdistel (<i>Cirsium canum</i>)						x	x	x	x			
Verschiedenblättrige Kratzdistel (<i>Cirsium heterophyllum</i>)						x	x	x				
Bachkratzdistel (<i>Cirsium rivulare</i>)					x	x						
Berg-Distel (<i>Carduus defloratus</i>)						x	x					
Klette (<i>Arctium</i> : alle Arten)						x	x	x				
Perückenflockenblume (<i>C. pseudophrygia</i>)							x	x				
Sonnenblume (<i>Helianthus annuus</i>)								x	x	x		
Gartenringelblume (<i>Calendula spec.</i>)	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x
Gänseblümchen (<i>Bellis perennis</i>)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Katzenpfötchen (<i>Antennaria dioica</i>)					x	x						
Gemswurz (<i>Doronicum spec.</i>)					x	x						
Kohlkratzdistel (<i>Cirsium oleraceum</i>)						x	x	x				
Stängellose Kratzdistel (<i>Cirsium acaule</i>)						x	x					
Arnika (<i>Arnica montana</i>)						x	x					
Pestwurz (<i>Petasites hybridus</i>)			x	x								
Golddistel (<i>Carlina vulgaris</i>)						x	x	x				

Die Korbblütengewächse sind eine besonders große und vielseitige Pflanzenfamilie, welche sich hervorragend zur Förderung der Wildbienen im Garten eignet. Zahlreiche Wildbienenarten haben sich auf diese Familie spezialisiert. Zur Familie gehören die Disteln. Disteln blühen meist in leuchtend pinken Büscheln und schwirren vor Leben. Die Ackerkratzdistel (*Cirsium arvense*) sollte als einzige Distelart mit Ausläufern systematisch gejätet werden. Alle anderen, großen Disteln sollten mit einer Dichte von max. 4 Stück/10m² stehen bleiben, wenn sie weder einen Gehfläche noch eine zarte Staude überdecken. Gute Beobachtungsstationen sind die Disteln, die Flockenblumen und die Verwandten der Kamille. Herbstblühende Korbblütler wie Astern und Sonnenblumen sind nur für sehr anpassungsfähige Wildbienenarten von Interesse.

Weitere Informationen und Bilder gibt es unter:

<http://www.wildbienengarten.de/pflanzenplaner/korbblütler>

www.floraweb.de bietet weitere Informationen zu den Pflanzenarten

Genauere Informationen, welche Wildbiene welche Pflanze zum Pollensammeln besucht, sind in dem folgenden Buch von Paul Westrich enthalten: Die Wildbienen Deutschlands, Ulmer Verlag 2018.

